

Entretien préalable au TROD COVID-19

Objectifs

- repérer les symptômes du COVID et les signes de gravités chez l'utilisateur
- déterminer les prises de risques antérieures ou récentes en rapport avec le virus du COVID-19
- avoir un aperçu de leur situation de vie (environnement, contact potentiel, animal de compagnie...)
- repérer les connaissances des usagers sur le virus du COVID-19
- rappeler ou informer quels sont les gestes barrières et l'importance de leurs mise en place dans leur quotidien, les adapter à leur mode de vie si besoin
- rappeler les symptômes du virus et les complications possibles liés au virus
- expliquer le déroulement du test, la complexité du résultat n'indique pas la présence du virus mais la présence des anticorps témoigne de la maladie COVID 19 actuelle ou guérie
- anticiper un résultat positif avec l'utilisateur pour envisager un éventuel changement dans son mode de vie (isolement, tracing), réaliser un contrôle sérologique par prise de sang et un prélèvement nasal par PCR pour recherche du virus
- anticiper un résultat négatif avec l'utilisateur en rappelant les gestes barrières, les symptômes du COVID-19 et réaliser de façon régulière un TROD, fenêtre sérologique (*régularité à déterminer*) en fonction des prises de risque et de l'évolution de l'épidémie
- obtenir son consentement à la réalisation du test

Rappel des signes de gravité à dépister

RESPIRATOIRE

→ **Tachypnée (fréquence respiratoire > 22/min)**, Oxygénométrie de pouls SpO₂<90 (selon comorbidités)

HÉMODYNAMIQUE

→ **Pression artérielle <90mmHg** ou pression artérielle moyenne <70mmHg, sueurs, marbrures, TRC allongé chez l'enfant

NEUROLOGIQUE

→ **Altération de la conscience** : confusion, somnolence

GÉNÉRAUX

→ en particulier chez le sujet âgé : déshydratation, oligurie, altération de l'état général brutale, confusion

**En cas de signe de gravité
appeler le SAMU 15**